

# Diatoméer fra *Tellina calcaria* Leret i Røgle Klint.

AF  
E. ØSTRUP.

En Prøve af det *Tellina calcaria* førende Ler i Røgle Klint ved Strib<sup>1)</sup> blev i 1891 overgivet mig til Undersøgelse af Professor N. V. USSING. Prøven var taget i Klintens nordvestligste Punt, 340 M. NNV for Gaarden Christiansminde; i den nordøstligste Del af det af V. MADSEN (l. c.) afbildede Profil.

Ved Gennemsøgning af tre Præparater fandt jeg i disse følgende Diatomé-Former:

*Actinocyclus alienus* GRUN. var. *arctica* GRUN. 2 Exp.

*Amphora ovalis* KRZ. 1 Skal.

*Biddulphia aurita* (LYNGB.) BRÉB. 1 Exp.

— *Roperiana* GREV. 1 Exp.

*Hemiaulus* sp. 1 Brudstykke. Det minder noget om *Hem. polycistinorum* EHR. var? *Sibirskiana* GRUN. (GRUN. Diat. Frz. Jos.-L. Tab. B. Fig. 45).

*Chaetoceros decipiens* CL. var. *concreta* GRUN. Et Par Exemplarer.

*Chaetoceros Diadema* (EHR.) GRAN. Hvilesporer ret almindelige.

*Chaetoceros distans* CL. Heraf findes kun Brudstykker af Horn, men disse meget almindeligt. De svare fuldstændigt til Afbildningen i VAN HEURCKS Syn. Tab. LXXXII Fig. 4.

<sup>1)</sup> MADSEN, V. 1895. Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten. Medd. Dansk geol. Foren. Nr. 2, p. 104.

*Cocconeis costata* GREG. 2 Exp.

*Diploneis coffæiformis* A. SCHM. 1 Exp.

— *Entomon* (EHR.) A. SCHM. 1 Exp.

— *Smithii* BRÉB. 2 Exp.

*Navicula* sp. vistnok *Nav. (Rhoiconeis) Bolleana* GRUN.

Kun en enkelt Skal, set fra Pleura-Siden.

*Nitzschia acicularis* W. SM. var? 1 Exp.

— *linearis* W. SM. var. *tenuis*? GRUN. En enkelt Gruppe.

— *socialis* GREG. En enkelt Gruppe.

*Pleurosigma elongatum* W. SM. 1 Brudstykke.

*Stauroneis anceps* EHR. var. *amphicephala* Ktz. 1 Exp.

*Stephanopyxis* sp. Vistnok *St. Turris* (GREG. RALFS) GRUN. var. *Cylindrus forma paucispina* GRUN. 1 Exp.

*Synedra Kamtschatica* GRUN. var. *minor* GRUN. Et Par Exp.

*Thalassiosira gravida* CL. Hvilesporer (*Coscinodiscus subglobosus* CL. & GRUN.) Hist og her i Præparaterne.

*Trachyneis aspera* EHR. 1 Brudstykke.

Hvad de ovennævnte Former angaar, da ere de med meget faa Undtagelser Saltvandsformer. Det ene Exemplar af *Stau. anc. amph.*, der er en Ferskvandsform, maa sikkert opfattes som en tilfældig Indblanding, maaske følgende med nedsivende Vand paa Findestedet. *Nitz. lin. ten.* er ligeledes en Ferskvandsform, dog er den fundet i enkelte Exemplarer i Kara-Havet. Iøvrigt er jeg for denne Arts Vedkommende ikke ganske sikker paa Bestemmelsens Rigtighed, da de enkelte Individuer i Gruppen delvis dække hinanden. Karakteristisk for Prøven er de mange Brudstykker af *Chaetoceros*-Horn og Hvilesporerne af *Chaet. Diadema*, og maaske ogsaa *Thalass. gravida*, hvis Sporer ikke kunne kaldes sjældne. Af de øvrige mere enkeltvis forekommende Former tilhøre nogle fortrinsvis de koldere Have.

Diatoméerne i denne Prøve tyde altsaa paa en Bundfældning i et koldt Hav.